


Información para las mujeres: Denosumab



Documento dirigido al profesional sanitario para informarle
del contenido de la MenoGuía para pacientes

Información para las mujeres: Denosumab

Las MenoGuías de la AEEM ofrecen material informativo para dar respuesta, en un lenguaje sencillo, a las cuestiones básicas que se plantea la población en general.

Esta información no pretende ser un sustituto del consejo médico, diagnóstico o tratamiento. Busque siempre la opinión de su propio médico u otro profesional sanitario cualificado respecto a cualquier duda. © 2013 AEEM.

Autor: Rafael Sánchez Borrego (*Barcelona*)

Editor Invitado: Antonio Cano Sánchez (*Valencia*)

Actualización de la información: Noviembre 2013

No se pretende ni se recomienda que el contenido de esta información sustituya al asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico. Siempre busque el consejo de su propio médico u otro profesional de la salud cualificado sobre cualquier cuestión o problemas médicos. El uso de esta información se rige por las condiciones de uso de AEEM 2013 ©.

Advertencia

- Este medicamento viene con una hoja de información para pacientes. Léalo con cuidado. Léalo de nuevo cada vez que deba utilizar este fármaco.

¿Para qué se utiliza este fármaco?

- Está indicado para tratar los huesos blandos, quebradizos (osteoporosis).
- Se utiliza para detener la pérdida ósea.
- Se usa como tratamiento de algunos tipos de cáncer.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de utilizar este fármaco?

- Si usted es alérgica al denosumab o a cualquier otro componente de este medicamento.
- Si usted es alérgico al látex, hable con su médico.
- Si usted es alérgico a alguna droga, alimentos u otras sustancias. Dígale a su médico

acerca de los síntomas de la alergia y si ha presentado en alguna ocasión como erupciones, urticaria, picor, dificultad para respirar, sibilancias, tos, hinchazón de la cara, los labios, la lengua, o la garganta, o cualesquier otro signo.

- Si tiene niveles bajos de calcio.
- Si está embarazada o puede estar embarazada.
- Si está en periodo de lactancia.

¿Qué debo hacer o saber mientras tomo este medicamento?

- Informe al dentista, cirujano, u otro profesional médico que usa este medicamento.
- Si usted tiene síndrome de mala absorción o le han extirpado alguna parte de su intestino, coménteselo a su médico.
- Si le han practicado una cirugía de tiroides o paratiroides, hable con su médico.
- Muy malas las infecciones se han reportado con el uso de esta droga. Si usted tiene cualquier tipo de infección, está tomando

antibióticos o en el pasado reciente, o si tiene muchas infecciones, consulte con su médico.

- Ha revisado su análisis de sangre. Hable con su médico.
- Hágase una prueba de densidad ósea. Hable con su médico.
- Hágase un examen dental antes de comenzar este medicamento.
- Cuide su estado dental. Acuda al dentista de forma regular.
- Utilice un método anticonceptivo en el que pueda confiar para prevenir el embarazo mientras usa este medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este medicamento?

Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o sólo efectos secundarios menores. Llame a su médico si cualquiera de estos efectos secundarios o cualquier otro efecto secundario le molesta:

- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Dolor de espalda.
- Dolor muscular.
- Se siente cansado o débil.
- Elevado nivel de colesterol.
- Irritación de la piel.
- Niveles bajos de calcio.
- Niveles bajos de fosfato.
- Dolor de cabeza.

- Tos.
- Dolor de estómago o vómitos.
- Daño al hueso de la mandíbula rara vez puede ocurrir.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este medicamento?

Si usted tiene alguno de estos efectos secundarios:

- Signos de una reacción alérgica, como erupción cutánea, urticaria, picazón, enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación con o sin fiebre, respiración sibilante, opresión en el pecho o garganta, problemas para respirar o hablar, ronquera inusual, o hinchazón de la boca, la cara, los labios, la lengua, o la garganta.
- Signos de infección. Entre otros, fiebre de 38° C o más alta, escalofríos, dolor importante de garganta, dolor de oídos o sinusitis, tos, mayor cantidad de flema o modificación en el color del esputo, micción dolorosa, heridas en la boca, llaga que se no se cura, picor en región anal.
- Dolor fuerte en la mandíbula.
- Dolor fuerte de estómago.
- Cualquier dolor nuevo o extraño en la ingle, la cadera o en el muslo.
- Entumecimiento u hormigueo en la boca.
- Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.
- Irritación grave de la piel.
- Estos no son todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos secundarios, llame a su doctor. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios.

■ ¿Cuál es la mejor forma de usar este medicamento?

- Si sus síntomas o problemas de salud no mejoran o si empeoran, consulte a su médico.
- No comparta sus medicamentos con otras personas ni tome medicamentos de nadie.
- Muéstrelle una lista de todos sus medicamentos (recetados, productos naturales, vitaminas,...) a su médico.
- Consulte a su médico antes de iniciar cualquier otro medicamento, con receta o sin receta, productos naturales, o vitaminas.
- Si usted tiene alguna pregunta acerca de este medicamento, consulte con su médico, farmacéutico u otro profesional sanitario.

Notas

A series of horizontal dotted lines for writing notes, contained within a pink rounded rectangular border.

